



# Paracentèse et drains transtympaniques

#### 1 - Fonction

Dans l'oreille moyenne il y a 3 osselets qui transmettent la vibration du tympan à l'oreille interne. Si l'oreille moyenne est mal aérée ou contient du liquide (otite séreuse), le tympan vibre mal et les osselets ne transmettent pas cette vibration. Ceci conduit à une baisse d'audition.

#### 2 - Indication

La baisse d'audition due à une otite séreuse et les otites à répétition.

### 3 – Opération

La paracentèse (incision du tympan) se fait en anesthésie générale. Le liquide de l'oreille moyenne (glue) est aspiré et si nécessaire un drain transtympanique mis en place.

### 4 – Risques et complications possibles

Les otites aigües ou chroniques sont rares, mais nécessitent de temps à autre un traitement antibiotique.

Rarement, une perforation résiduelle tympanique persiste et une réparation chirurgicale (tympanoplastie) est nécessaire.

Après cicatrisation du tympan, il peut y avoir récidive d'otite séreuse. Parfois une nouvelle opération est nécessaire.

# 5 - Evolution postopératoire

Immédiatement après l'opération il peut y avoir un écoulement muqueux ou sanguinolent par le conduit auditif. La paracentèse cicatrise la plupart du temps en une semaine. Lors de la mise en place d'un drain transtympanique celui-ci est expulsé spontanément dans un intervalle de 6 à 12 mois dans la plupart des cas. La perforation tympanique résiduelle cicatrise en quelques semaines.

## Conseils pour limiter les complications

- Après une paracentèse, il faut éviter que de l'eau entre dans le conduit auditif, jusqu'à cicatrisation du tympan (environ une semaine)
- Votre enfant ne doit pas plonger aussi longtemps que le drain est en place.
- Lors du lavage des cheveux, il faut éviter que de l'eau, spécialement du savon ou du shampoing n'entre dans le conduit auditif, aussi longtemps que le tympan n'est pas étanche.

# Coordonnées de contact

Numéro tél. hôpital: Numéro tél. médecin:

Inf	orm	at	ions	importantes	pour	les	patients	ŧ
-								

Anesthésie:

Durée de l'opération :

Durée de l'hospitalisation :

Durée de convalescence/récupération :

Autres: